

ERRATA

SUPER REVISÃO DENTISTA - Secretarias de Saúde - 709 Questões Comentadas e Resumos
1ª edição

Página: 26.

Questão: 07.

Capítulo: Anatomia de Cabeça e Pescoço.

Autor: Sandra de Quadros Uzêda

(PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS, 2012 / MSCONCURSOS) Com relação à morfologia de uma coroa anatômica, assinale a alternativa que representa o termo para a seguinte definição: "É o aumento ou protuberância no terço cervical da face lingual da coroa nos dentes anteriores".

- Ⓐ Sulco.
- Ⓑ Mamelão.
- Ⓒ Fossa.
- Ⓓ Cíngulo.
- Ⓔ Crista cervical.

Alternativa A - FALSA. Os sulcos de um dente são depressões, paralelas ao longo eixo do dente, localizados nas faces vestibulares de dentes anteriores, mais frequentemente, em dentes jovens. Nos dentes posteriores, os sulcos estão na face oclusal.

Alternativa B - FALSA. O mamelão ou mamelões, pois são três, são segmentos das faces vestibulares, delimitados pelos sulcos de desenvolvimento. São os mamelões incisais.

Alternativa C - FALSA. Fossa é elemento anatômico que consiste em uma depressão ou concavidade localizada no terço incisal, na face lingual ou palatina dos dentes anteriores.

Alternativa D - VERDADEIRA. O cíngulo é uma protuberância no terço cervical da face palatina (lingual) da coroa nos dentes anteriores".

Alternativa E - FALSA. As cristas de um dente são saliências de esmalte. Nos dentes anteriores localizam-se nas porções proximais da face lingual, estendendo-se da borda incisal ao cíngulo. Nos dentes posteriores localizam-se nos terços proximais da face oclusal e unem as cúspides linguais às vestibulares.